





*Waldklee (Vicia cracca)*

Der Waldklee ist eine der häufigsten Arten der Gattung Waldklee (Vicia) in Mitteleuropa. Er ist eine Kletterpflanze, die sich an Bäumen und Sträuchern hochziehen kann. Die Blütezeit reicht von Mai bis August. Die Pflanze ist in der Regel in Laubwäldern zu finden.

Die Blüte ist eine Schmetterlingsblüte, die aus zwei großen Schmetterlingsblüten besteht. Die Blüten sind in der Regel violett oder lila gefärbt. Die Pflanze ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten, insbesondere für die Raupen von Schmetterlingen.



Die Blütezeit des Waldklee beginnt im Mai und dauert bis in den August an. Die Pflanze ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten, insbesondere für die Raupen von Schmetterlingen. Die Pflanze ist in der Regel in Laubwäldern zu finden.

Die Blüte ist eine Schmetterlingsblüte, die aus zwei großen Schmetterlingsblüten besteht. Die Blüten sind in der Regel violett oder lila gefärbt. Die Pflanze ist eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten, insbesondere für die Raupen von Schmetterlingen.



Fot. 6



Fot. 5



Fot. 6





Kierunek Wędrówki



