












OPIS MATERIAŁU ROŚLINNEGO – PROMENADA HISTORYCZNA					
Lp.	Łacina	Nazwa polska	Opis		
drzewa					
h1	<i>Platanus acerifolia</i>	Platan klonolistny (forma parasol)	Drzewo z charakterystycznie łuszczącą się dużymi płatami jasną korą. Liście przypominają liście klonu, jesienią wybarwiają się na brązowo-zielono. Owoce – kulki zwisające na długich szypułkach, ozdobne, utrzymują się na roślinie do wiosny. Platan bardzo dobrze radzi sobie w warunkach miejskich, znosi cięcia, preferuje stanowiska słoneczne i osłonięte, gleby żyzne. Odmiana formowana na parasol.	Termin kwitnienia: - kolor kwiatów: - zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
krzewy i trawy					
h2	<i>Potentilla fruticosa</i> 'McKay's White'	Pięciornik krzewiasty 'McKay's White'	Odmiana pięciornika osiągająca od 120 cm wysokości i do 150 cm szerokości. Liście drobne, ciemnozielone, pierzasto złożone. Kwiaty białe z żółtymi pręcikami, charakteryzuje się długim terminem kwitnienia (VI-IX). Preferuje stanowiska słoneczne, gleby piaszczysto gliniaste lub lekkie piaszczyste. Niewymagający krzew okrywowy, odporny na mrozy i zanieczyszczenia środowiska.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec – wrzesień</b> kolor kwiatów: <b>biały</b> zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h3	<i>Spiraea xarguta</i>	Tawuła wczesna	Krzew do 200 cm wysokości z charakterystycznie przewieszającymi się pędami. Liście wydłużone, jasnozielone, młode owłosione. Kwitnie na białą, na zeszłorocznych pędach, bardzo obfite - od maja do czerwca. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, lekkich i na stanowiskach ciepłych. Odmiana wytrzymała na suszę	Termin kwitnienia: <b>maj – czerwiec</b> kolor kwiatów: <b>biały</b> zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




h4	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Anabelle'	Hortensja drzewiasta 'Anabelle'	Bardzo efektownie kwitnący krzew o luźnym pokroju, osiągający do 100-150 cm wysokości. Liście ładne – jasnozielone. Kwiaty na jednorocznych pędach - kremowobiałe, białe, w bardzo dużych półkolistych kwiatostanach, złożone z płonnych kwiatów, pojawiają się na roślinie od VI do końca VIII. Hortensja preferuje stanowiska osłonięte i półcieniste, gleby lekkie, próchniczne lub gliniaste o kwaśnym odczynie. Walory ozdobne zachowuje również zimą.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec – sierpień</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h5	<i>Rosa</i> 'Swany'	Róża okrywowa 'Swany'	Róża okrywowa o płaskim pokroju, dorasta do 60 cm wysokości przy ponad 150 cm szerokości. Liście drobne, ciemnozielone i błyszczące. W czasie kwitnienia od VI do X tworzy dywany z białymi pojedynczymi kwiatami zebrane w duże kwiatostany. Krzew wymaga stanowisk słonecznych, dobrze radzi sobie w każdej przeciętnej ziemi ogrodowej, mrozoodporność dobra	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h6	<i>Perovskia</i> 'Blue Spider'	Perovskia 'Blue Spider'	Srebrzysty krzew o zwartym pokroju z niebieskimi kwiatami osiągający do 120 cm wysokości przy 80 cm szerokości. Listki drobne szarzielone do srebrzystych, charakterystycznie pachnące po roztarciu. Kwiaty niebieskofioletowe, rurkowate i malutkie, zebrane w kłosowatych kwiatostanach do 30 cm długości osadzone wzdłuż pędów. Perovskia preferuje stanowiska słoneczne i suche, podłoże przepuszczalne o odczynie zasadowym lub obojętnym, (przy wysokim pH ładniej się wybarwia). Górna część rośliny zwykle przemarza dlatego zalecane	Termin kwitnienia: <b>lipiec - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>niebieski</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




			wiosenne niskie cięcia.		
h7	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Pink Queen'	Pięciornik krzewiasty 'Pink Queen'	Gęsty, niski krzew z pokładającymi pędami, do 80 cm wysokości przy ponad 100 cm szerokości. Liście pierzaste, drobne, jasnozielone. Kwiaty jasno różowe z żółtymi słupkami i pręcikami, od spodu białe, pojawiają się dość obficie od V do X (kolor kwiatów zależy od stanowiska – im chłodniej i bardziej wilgotno tym intensywniej wybarwione). Pięciornik dobrze rośnie na glebach lekkich, piaszczystych lub piaszczysto – gliniastych. Preferuje stanowiska nasłonecznione. Wytrzymały na suszę i niskie temperatury.	Termin kwitnienia: <b>maj - październik</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h8	<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	Lilak Meyera 'Palibin'	Zwarty i bardzo gęsty krzew o półkolistym pokroju, osiąga 150 cm wysokości i szerokości. Liście pojawiają się wczesną wiosną – niewielkie, ciemnozielone i delikatnie pofalowane. Kwiaty drobne, zebrane w liczne kwiatostany na wiechach - fioletowe, podobne do kwiatów lilaka pospolitego, charakteryzuje je silne wydzielanie przyjemnego zapachu co m.in. przyciąga motyle. Kwitnie od V do VI, później może powtarzać ale mniej intensywnie. Palibin dobrze radzi sobie na glebach przeciętnych, umiarkowanie wilgotnych i przepuszczalnych, na stanowisku słonecznym ładnie kwitnie.	Termin kwitnienia: <b>maj - czerwiec</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h9	<i>Spiraea densiflora</i>	Tawuła gęstokwiatowa	Krzew o płaskokulistym pokroju, osiągający 80 cm wysokości. Listki zielone, bardzo ładnie przebarwiające się jesienią. Kwiaty w płaskich kwiatostanach – różowe, pojawiają się od VI do VII na jednorocznych pędach. Tawuła ma niewielkie wymagania środowiskowe, odmiana mrozoodporna	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




h10	<i>Rosa 'Bonica'</i>	Róża rabatowa 'Bonica'	Róża okrywowa dorastająca do 80 cm wysokości przy 60 szerokości. Liście błyszczące, ciemnozielone, długo utrzymują się na roślinie. Kwiaty pełne, jasno różowe, samoczynzące (kwiatki opadają po przekwitnięciu). Owoce równie dekoracyjne, szupinkowe, utrzymujące się przez całą zimę. Bonica wymaga stanowisk słonecznych, dobrze radzi sobie w każdej przeciętnej ziemi ogrodowej, mrozoodporność bardzo dobra	Termin kwitnienia: <b>od czerwca do mrozów</b>  kolor kwiatów: <b>jasny róż</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h11	<i>Physocarpus opulifolius 'Purpureus'</i>	Pęcherznica kalinolistna 'Purpureus'	Krzew o wyprostowanych pędach, do 300 cm wysokości. Pędy ciemno purpurowe, delikatne wygięte na końcach, z paskami łuszczącej się kory. Liście ciemnoczerwone, trójkłapowe, młode w kolorze miedzianym, starsze purpurowe. Kwiatostany kontrastująco białe, w półkolistych kwiatostanach, pojawiają się od VI do VII. Owoce – czerwone pęcherzyki. Preferuje stanowiska nasłonecznione (w cieniu przebarwia się na zielono). Bardzo odporna na niskie temperatury, bez specjalnych wymagań środowiskowych	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h12	<i>Berberis Thunbergii 'Bagatelle'</i>	Berberys Tunberga 'Bagatelle'	Karłowaty, wolno rosnący krzew do 40 cm wysokości o płasko kulistym pokroju i ostrych cierniach. Liście purpurowo i brązowo-czerwone, jesienią bardzo ładnie wybarwiają się na szkarłatny. Kwiaty żółte, niepozorne, pojawiają się w V. Krzew ma lo wymagający, preferuje stanowiska słoneczne, gleby kwaśne po umiarkowanie alkaliczne. Bardzo odporny na niskie temperatury i silne wiatry.	Termin kwitnienia: <b>maj</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	






h13	<i>Rosa 'Marathon'</i>	Róża okrywowa 'Marathon'	Krzewiasta róża okrywowa, dorasta do 70 cm wysokości przy 80 szerokości. Liście ciemnozielone, błyszczące, długo utrzymują się na roślinie. Kwiaty pojedyncze, intensywnie różowo-czerwone. Owoce równie dekoracyjne – pomarańczowe. Marathon wymaga stanowisk słonecznych, dobrze radzi sobie w każdej przeciętnej ziemi ogrodowej, mrozoodporność bardzo dobra	Termin kwitnienia: <b>czerwiec – październik</b>  kolor kwiatów: <b>czerwony</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h14	<i>Forsythia 'Maluch'</i>	Forsycja 'Maluch'	Krzew o zwartym i regularnym pokroju, wolno rosnący, maksymalnie do 100 cm wysokości i szerokości. Liście wąskie, drobne, ciemnozielone, kwiaty charakterystycznie dla gatunku żółte, osadzone obficie wzdłuż gałązek, pojawiają się od początku IV. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych i zasobnych glebach, nie znosi przesuszania. Odporny na niskie temperatury.	Termin kwitnienia: <b>kwiecień</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h14a	<i>Potentilla fruticosa 'Kobold'</i>	Pięciornik krzewiasty 'Kobold'	Zwarty i niski krzew okrywowy, dorasta do 50 cm wysokości. Liście stosunkowo duże, pierzasto złożone, soczyście-zielone. Kwiaty duże, żółte, złożone z pięciu płatków, pojawiają się od VI do X. Pięciornik preferuje stanowisko słoneczne, wtedy obficie kwitnie, gleby lekkie i piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste. Odporny krzew, wytrzymały na mrozy, suszę i warunki miejskie	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




h14b	<i>Hipericum 'Hidcote'</i>	Dziurawiec 'Hidcote'	Krzew ozdobny, dorastający od 50 do 100 cm wysokości. Liście lancetowate, matowe, ciemnozielone. Kwiaty talerzykowate, kontrastująco żółte, pojawiają się nieprzerwanie od VI do X. Preferuje gleby przeciętne, stanowiska słoneczne lub lekki półcień. Dziurawiec dobrze regeneruje się po mocnych cięciach	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h14c	<i>Potentilla fruticosa 'Sunset'</i>	Pięciornik krzewiasty 'Sunset'	Okrywowy krzew o zaokrąglonym i zwartym pokroju, dorasta do 50 cm wysokości, pędy pokładające się i delikatnie łukowato wzniesione. Na starszych egzemplarzach kora czerwono-brunatna i charakterystycznie postrzępiona. Liście szarozielone, pierzasto złożone. Kwiaty promieniste, na zewnątrz pomarańczowe, w słońcu wybarwiają się i matowieją na żółto (w półcieniu intensywniejszy kolor), pojawiają się od VI do IX. Preferuje stanowiska słoneczne, gleby lekkie i piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste. Roślina odporna na warunki miejskie, niskie temperatury i suszę.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h15	<i>Buxus sempervirens</i>	Bukszpan wieczniezielony	Zimozielony gęsty krzew o powolnym wzroście, nieformowany dorasta do ponad 300 cm wysokości. Liście owalne, ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty miododajne choć niepozorne. Nie ma wymagań co do stanowiska, od słonecznych do cienistych, gleby zasobne w humus – od obojętnych do wapiennych. Doskonale znosi cięcia.	Termin kwitnienia: -  kolor kwiatów: -  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	


h16	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	Wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami, nieformowany dorasta do 250 cm wysokości. Liście ciemnozielone, błyszczące, jesienią wybarwiają się w szkarłatnych odcieniach. Kwiaty różowe, pojawiają się od V do VI, Odmiana toleruje wszystkie rodzaje gleb, bez specjalnych wymagań stanowiskowych (w słońcu jesienią ładniej się wybarwia). Całkowicie odporny na mróz, doskonale znosi cięcia.	Termin kwitnienia:  kolor kwiatów:  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h17	<i>Festuca glauca</i>	Kostrzewa sina	Zimozielona trawa, która tworzy zwarte poduszki popielatych, niebieskozielonych liści do 20 cm wysokości, nie tworzy darni, rozsiewa się dzięki kwiatostanom, które pojawiają się od V do IV. Kostrzewa preferuje stanowiska przepuszczalne z dodatkiem piasku i miejsca nasłonecznione. Znosi suszę. Co kilka lat zalecane jest odmładzanie poprzez dzielenie kęp.	Termin kwitnienia:  kolor kwiatów:  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h18	<i>Calamagrostis xacutiflora</i> 'Overdam'	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam'	Trawa o zwartym i sztywnym pokroju, tworząca gęste kępy do 60 cm średnicy, w czasie kwitnienia dorasta nawet do 180 cm wysokości. Główną dekoracją są wiechowate, rozpięzchłe kwiatostany pojawiające się od VI do VIII, na początku czerwono-brązowe, później beżowo-żółte oraz błyszczące liście do 90 cm długości. Odmiana preferuje stanowiska słoneczne oraz gleby żyzne i próchniczne, dobrze zdrenowane. Odporny na mróz. Walory ozdobne zachowuje również zimą.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - sierpień</b>  kolor kwiatów: <b>beżowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	




h19	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	Rozplenica japońska	Bardzo ozdobna trawa tworząca gęste kępy do 100 cm wysokości. Liście wąskie od 30 do 60 cm długości. Kwiatostany żółte, brązowe lub ciemnopurpurowe, do 20 cm długości, przypominają „ogon wiewiórki”, pojawiają się od VIII do X. Rozplenica wymaga stanowisk półcienistych do cienistych i miejsc osłoniętych od silnych wiatrów, w związku z tym, że może przemarzać, obumarłe liście należy ścinać wiosną.	Termin kwitnienia: <b>sierpień - październik</b>  kolor kwiatów: <b>beżowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h20	<i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails'	Ostnica mocna 'Pony Tails'	Malownicza trawa ozdobna o bardzo cieniotkich i zwiewnych wiechach kwiatostanowych przypominające „koński ogon”. Kwitnienie rozpoczyna się w VI wtedy pojawiają się luźne włosowate wiechy, dorasta do 60 cm wysokości. Ostnica preferuje podłoża przepuszczalne, dobrze zdrenowane, gdzie nie zatrzymuje się woda podczas wiosennych roztopów. Stanowisko słoneczne i ciepłe, nie znosi zalewania i silnego nawożenia.	Termin kwitnienia: <b>od czerwca</b>  kolor kwiatów: <b>beżowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>bardzo małe</b>	
Byliny					
h21	<i>Salvia nemorosa</i>	Szałwia omszona	Bylina rabatowa, średniej wielkości, dorasta do 70 cm wysokości. Pędy liczne i wzniesione, zakończone rozgałęzionymi, kłosowatymi kwiatostanami, wybarwione na fioletowo już od IV (regularne wycinanie przekwitłych kwiatostanów przedłuża kwitnienie). Nie ma specjalnych wymagań środowiskowych.	Termin kwitnienia: <b>od kwietnia</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	






h22	<i>Nepeta xfaassenii</i>	Kocimiętka Faassena	Bylina o mocno rozgałęziających się pędach, dorasta do 50 cm wysokości. Liście charakterystycznie szarzielone. Kwiaty fioletowe w kłosowatych kwiatostanach, pojawiają się od V do IX. Nie ma specjalnych wymagań, na stanowisku słonecznym lepiej kwitnie.	Termin kwitnienia: <b>maj - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h23	<i>Geranium xmagnum</i>	Bodziszek wspinały	Okazała bylina, dorasta do 70 cm wysokości, o charakterystycznie dużych fioletowych kwiatach, które pojawiają się bardzo obficie w VI. Preferuje stanowiska słoneczne i żyzne gleby.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h24	<i>Campanula latifolia</i>	Dzwonek szerokolistny	Bylina dorastająca do 100 cm wysokości. Łodygi nierozgałęzione, w pełni ulistnione, listki charakterystycznie sercowate z ząbkowanym brzegiem. Kwiaty duże i fioletowe, szeroko-dzwonkowate, pojawiają się od VI do VIII (rozsiewa się w sprzyjających warunkach). Nie ma specjalnych wymagań.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - sierpień</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




h25	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	Jeżówka purpurowa 'Alba'	Bylina o silnych, wyprostowanych i słabo rozgałęzionych pędach, dorasta do 100 cm wysokości. Koszyczki kwiatowe z kolczastym, spiczastym środkiem i delikatnie zwisającymi białymi języczkowymi kwiatami, pojawiają się od VIII do IX (usuwanie przekwitłych wydłuża kwitnienie). Jeżówka preferuje gleby żyzne, nie przesuszone, miejsca słoneczne	Termin kwitnienia: <b>sierpień - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h26	<i>Salvia nemorosa</i> 'Adrian'	Szałwia omszona 'Adrian'	Oryginalna odmiana popularnej szalwii, osiąga 40 cm wysokości tworząc półkolistę kępę ze sztywno wzniesionymi pędami. Liście pomarszczone brąznozielone. Od VI pojawiają się kłosowate kwiatostany, które po kwitnieniu należy krótko przyciąć wtedy jesienią zakwitną na nowo (po cięciach nawieźć mieszanką wieloskładnikową). Preferuje stanowiska słoneczne z glebą żyzną i przepuszczalną	Termin kwitnienia: <b>od czerwca</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h27	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'	Bylica luizjańska 'Silver Queen'	Wieloletnia roślina z wyprostowanymi pędami dorasta do 100 cm wysokości przy 50 cm szerokości. Liście pąki i łodygi pokryte są srebrnym kutnerem. Kwitnie od IX do X na żółto. Preferuje zdrenowane gliniaste gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym, dobrze nasłonecznionym (w półcieniu zielenieje), nie znosi zalewania. W pełni mrozoodporna	Termin kwitnienia:   kolor kwiatów:   zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	


h28	<i>Stachys byzantina</i>	Czyściec wełnisty	Bylina o płożących się łodygach z dużymi, jajowatymi liśćmi, pokrytymi gęstym, białym kutnerem, dorasta do 40 cm wysokości. Kwitnie od VI do VII. Bez specjalnych wymagań, dobrze znosi suszę	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h29	<i>Echinops ritro 'Elijah blue'</i>	Przegorzan pospolity 'Elijah blue'	Bylina osiągająca wysokość do 100 cm. Liście po górnej stronie gładkie, pod spodem pokryte białym kutnerem. Kwiaty w oryginalnych – okrągłych główkach, stalowo niebieskie jeszcze przed kwitnieniem. Roślina nie ma specjalnych wymagań środowiskowych, bardzo tolerancyjna i mrozoodporna.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - sierpień</b>  kolor kwiatów: <b>niebieski</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h30	<i>Echinacea purpurea</i>	Jeżówka purpurowa	Bylina o silnych, wyprostowanych i słabo rozgałęzionych pędach, dorasta do 100 cm wysokości. Koszyczki kwiatowe ciemnobrązowe z kolczastym, spiczastym środkiem i delikatnie zwisającymi purpurowymi języczkowymi kwiatami, pojawiają się od VIII do IX (usuwanie przekwitłych wydłuża kwitnienie). Jeżówka preferuje gleby żyzne, nie przesuszone, miejsca słoneczne	Termin kwitnienia: <b>sierpień - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>purpurowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h31	<i>Achillea millefolium 'Paprika'</i>	Krwawnik pospolity 'Paprika'	Bylina o dość sztywnych, wzniesionych pędach, słabo rozgałęzionych, dorasta do 100 cm wysokości. Listki wydłużone, młode wełniasto owłosione. Koszyczki kwiatowe drobniutkie, zebrane w płaskie, talerzykowate kwiatostany, krwistoczerwone z żółtym środkiem, pojawiają się od VI do X (zalecane jest usuwanie	Termin kwitnienia: <b>czerwiec – październik</b>  kolor kwiatów: <b>czerwony</b>  zapotrzebowanie na wodę:	




			przekwitłych kwiatostanów w celu wydłużenia kwitnienia i nie dopuszczenia samosiewu). Preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione, gleby umiarkowanie wilgotne do wilgotnych, a nawet suchych	<b>małe</b>	
h32	<i>Kniphofia uvaria</i> 'Orange Vanilla Popsicle'	Trytoma groniasta 'Orange Vanilla Popsicle'	Odmiana trytomy, potocznie zwana 'płonącą pochodnią', bylina o karłowym wzroście do 60 cm wysokości, tworzy kępy równowąskich, długich i liści. Bardzo dekoracyjne kwiatostany pojawiają się naprzemiennie od VI do X na sztywnych pędach, kwiaty drobne i zwisające w kolorze żółto pomarańczowym. Trytoma najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, glebach umiarkowanie wilgotnych i żyznych, w zimie nie znosi zalewania	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółto - pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h33	<i>Sedum spectabile</i> 'Brillant'	Rozchodnik okazały 'Brillant'	Bylina, bardzo okazała, dorasta do 50 cm wysokości. Pędy grube i mięsiste, pokryte grubymi liśćmi z niebieskawym nalotem. Kwiatostany płaskie i gęste w odcieniach jaskraworóżowych zdobią roślinę od VIII do X. Nie ma specjalnych wymagań, po zimie bardzo szybko się odradza, nie znosi zalewania – wtedy gnije.	Termin kwitnienia: <b>sierpień– październik</b>  kolor kwiatów: <b>ciemny róż</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h34	<i>Achillea</i> 'Cerise Queen'	Krwawnik pospolity 'Cerise Queen'	Bylina o wzniesionych, sztywnych i nierozgałęzionych pędach, dorasta do 80 cm wysokości. Liście wydłużone, młode wełniście owłosione. Koszyczki kwiatowe drobnutkie, zebrane w płaskie, talerzykowate kwiatostany, różowe, Pojawiają się od VI do X (zalecane jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów w celu wydłużenia kwitnienia i nie dopuszczenia samosiewu). Preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione, gleby umiarkowanie wilgotne do wilgotnych, a nawet suchych	Termin kwitnienia: <b>czerwiec– październik</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	






h35	<i>Hemerocallis xhybrida</i>	Liliowiec rdzawy	Bylina o charakterystycznie długich i wąskich liściach tworzących okazałe kępy. Kwiaty na długich szypułkach pojawiają się od V do VII i dorastają od 30 do 120 cm wysokości, wybarwiają się w odcieniach pomarańczy i brązów. Liliowiec preferuje stanowiska słoneczne, gleby żyzne i przepuszczalne	Termin kwitnienia: <b>maj - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h36	<i>Achillea 'Walther Funcke'</i>	Krwawnik pospolity 'Walther Funcke'	Bylina o wzniesionych, sztywnych i nierozgałęzionych pędach, dorasta do 60 - 80 cm wysokości. Liście wydłużone, młode wełniście owłosione. Koszyczki kwiatowe drobnutkie, zebrane w płaskie, talerzykowate kwiatostany, o rdzawo pomarańczowym wybarwieniu, Pojawiają się od VI do X (zalecane jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów w celu wydłużenia kwitnienia i nie dopuszczenia samosiewu). Preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione, gleby umiarkowanie wilgotne do wilgotnych, a nawet suchych	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h37	<i>Agastache x pallidiflora 'Summer Glow'</i>	Kłosowiec ogrodowy 'Summer Glow'	Aromatyczna bylina dorastająca do 60 cm wysokości. Pędy pojedyncze, wzniesione i słabo rozgałęzione. Liście od spodu owłosione, jajowate. Od VI do IX pojawiają się dekoracyjne kłosa złożone z żółto pomarańczowych kwiatków. Kłosowiec preferuje stanowiska słoneczne, glebę umiarkowanie wilgotną i przepuszczalną.	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>odcienie pomarańczy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	




h38	<i>Kniphofia uvaria</i> 'Royal Standard'	Trytoma groniasta 'Royal Standard'	Egzotycznie wyglądająca bylina dorasta do 80 cm wysokości, tworzy kępy równowąskich, długich i sztywnych liści. Bardzo dekoracyjne kwiatostany pojawiają się od VIII do IX na sztywnych pędach, kwiaty drobne i zwisające w kolorze żółto pomarańczowym. Trytoma najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, glebach umiarkowanie wilgotnych i żyznych, w zimie nie znosi zalewania	Termin kwitnienia: <b>sierpień - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>żółto - pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h39	<i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Carpet'	Berberis Thunberga 'Golden Carpet'	Okrywowy krzew karłowaty o wyprostowanych, ciernistych pędach, dorasta do 50 cm wysokości i szerokości. Liście drobne i żółte, kwiaty niepozorne – jasnożółte. Dobrze radzi sobie w każdych warunkach i w przeciętnej ziemi ogrodowej, (na pełnym słońcu listki mogą ulegać delikatnemu poparzeniu.	Termin kwitnienia: -  kolor kwiatów: -  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h40	<i>Achillea filipendulina</i> 'Cloth of Gold'	Krwawnik wiązówkowaty 'Cloth of Gold'	Bylina o sztywnych, wyprostowanych pędach i kępiastym pokroju, dorastająca do 150 cm wysokości. Liście pierzaste, pokryte tak jak łodygi szarymi włoskami. Kwiaty pojawiają się od VI do VIII i składają się na żółte, dekoracyjne baldachogrona. Krwawnik wiązówkowaty preferuje miejsca nasłonecznione, gleby żyzne i przepuszczalne. Zalecane jest przycinanie przekwitłych kwiatostanów w celu wznowienia kwitnienia przez roślinę, pędy ciąć na krótko wiosną	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - sierpień</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	



h41	<i>Rudbeckia fulgida</i>	Rudbekia błyskotliwa	Kępiasta bylina z rozgałęzionymi pędami dorastająca do 60 cm wysokości. Od VIII do X na końcach pędów pojawiają się bardzo dekoracyjne złotożółte koszyczki kwiatowe z ciemnymi, kontrastującymi środkami. Rudbekia najlepiej rośnie w miejscach nie przesuszanych latem – na glebach żyznych	Termin kwitnienia: <b>sierpień - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h42	<i>Hemerocallis 'Stella de Oro'</i>	Liliowiec 'Stella de Oro'	Karłowa odmiana liliowca o długich, wąskich liściach tworzących dekoracyjne kępy, dorasta do 40 cm wysokości. Kwiaty duże, liliokształtne w odcieniach żółci, pojawiają się na wyniosłych szypułkach od VI. Liliowiec preferuje stanowiska słoneczne, gleby żyzne i przepuszczalne	Termin kwitnienia: <b>od czerwca</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h43	<i>Echinacea 'Meteor Yellow'</i>	Jeżówka 'Meteor Yellow'	Bylina o zwartych, wyprostowanych i dobrze rozgałęzionych pędach, dorasta do 50-60 cm wysokości. Koszyczki kwiatowe duże i podwójne, bardzo dekoracyjne - żółte, pojawiają się od VII do IX (usuwanie przekwitłych wydłuża kwitnienie). Jeżówka preferuje gleby żyzne, nie przesuszone, miejsca słoneczne	Termin kwitnienia: <b>lipiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h44	<i>Kniphofia uvaria 'Bees Lemon'</i>	Trytoma groniasta 'Bees Lemon'	Egzotycznie wyglądająca bylina dorasta do 80 cm wysokości, tworzy kępy równowąskich, długich i sztywnych liści. Bardzo dekoracyjne kwiatostany pojawiają się od VII do IX na sztywnych pędach, kwiaty drobne i zwisające w kolorze żółto lemonkowo zielonym. Trytoma najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, glebach umiarkowanie wilgotnych i żyznych z dodatkiem próchnicy, w zimie nie znosi	Termin kwitnienia: <b>lipiec - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	




			zalewania		
rośliny jednoroczne					
h45	<i>Bellis perennis</i>	Stokrotka pospolita	Rodzima roślina, dorasta do 20 cm wysokości, która tworzy rozetę przy ziemi i rozłogi pod ziemią. Na wyprostowanych pędach charakterystyczne dla gatunku kwiatostany koszyczkowe z różowymi płatkami, pojawiają się od III do VII. Nie ma specjalnych wymaga środowiskowych, choć najlepiej rośnie w podłożu umiarkowanie wilgotnym, żyznym i próchnicznym o odczynie lekko kwaśnym, na stanowiskach słonecznych. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia	Termin kwitnienia: <b>marzec - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
	<i>Bellis perennis</i>	Stokrotka pospolita	Rodzima roślina, dorasta do 20 cm wysokości, która tworzy rozetę przy ziemi i rozłogi pod ziemią. Na wyprostowanych pędach charakterystyczne dla gatunku kwiatostany koszyczkowe z ciemno różowymi płatkami, pojawiają się od III do VII. Nie ma specjalnych wymaga środowiskowych, choć najlepiej rośnie w podłożu umiarkowanie wilgotnym, żyznym i próchnicznym o odczynie lekko kwaśnym, na stanowiskach słonecznych. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia		
	<i>Bellis perennis</i>	Stokrotka pospolita	Rodzima roślina, dorasta do 20 cm wysokości, która tworzy rozetę przy ziemi i rozłogi pod ziemią. Na wyprostowanych pędach charakterystyczne dla gatunku kwiatostany koszyczkowe z białymi płatkami, pojawiają się od wczesnej wiosny do zimy. Nie ma specjalnych wymaga środowiskowych, choć najlepiej rośnie w podłożu umiarkowanie wilgotnym, żyznym i próchnicznym o odczynie lekko kwaśnym, na stanowiskach słonecznych. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	






			jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia		
h46	<i>Myosotis</i>	Niezapominajka	Ozdobna, niska roślina osiągająca 15 cm wysokości, liście wąskie, soczyście zielone z mieszkciem, kwiaty drobne, niebieskie z żółtym oczkiem, pojawiają się od V do VI. Niezapominajki dobrze radzą sobie w przeciętnej i wilgotnej glebie, na stanowisku słonecznym jak i w półcieniu	Termin kwitnienia: <b>maj - czerwiec</b>  kolor kwiatów: <b>niebieski</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
	<i>Myosotis</i>	Niezapominajka	Ozdobna, niska roślina osiągająca 15 cm wysokości, liście wąskie, soczyście zielone z mieszkciem, kwiaty drobne, różowe z żółtym oczkiem, pojawiają się od V do VI. Niezapominajki dobrze radzą sobie w przeciętnej i wilgotnej glebie, na stanowisku słonecznym jak i w półcieniu	Termin kwitnienia: <b>maj - czerwiec</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h47	<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykladają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	




<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykładają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykładają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b> błękitny</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykładają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>czerwony</b>  zapotrzebowanie na wodę:	


		odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	małe	
<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykładają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
<i>Viola tricolor var. hortensis</i>	Bratek ogrodowy	Roślina z rodziny fiołkowatych, dorasta do 25 cm wysokości, rozgałęzione łodygi wykładają się na dole i unoszą ku górze. Pięcio-płatkowe kwiaty stanowią główną ozdobę, osiągają średnicę do 10 cm, pojawiają się od III w zależności od odmiany występują w przeróżnych zestawieniach kolorystycznych, jednak charakterystyczny dla wszystkich odmian jest aksamitny połysk. Bratki najbujniej kwitną w pełnym słońcu, najlepsza do uprawy będzie gleba próchniczna i żyzna o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Zalecane nawozy przeznaczone dla roślin jednorocznych dla utrzymania bujnego kwitnienia, obrywanie przekwitłych znacznie przedłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>od marca</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	

h48	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Kosmos podwójnie pierzasty	Jednoroczna roślina o krzaczastym pokroju, osiągająca 80 - 120 cm wzrostu. Liście drobne, jasnozielone – z wyglądu przypominają koper. Kwiaty – duże koszyczki, języczkowe osadzone w jednym okółku, rurkowate - żółte, różniące się między sobą w zależności od odmiany. Kosmos najlepiej rośnie na glebach średnio żyznych i na stanowisku słonecznym, roślina mało wymagająca	Termin kwitnienia: <b>lipiec - październik</b>  kolor kwiatów:   zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h49	<i>Tagetes erecta</i>	Aksamitka wyniosła	Jednoroczna roślina o wzniesionym i kępiastym pokroju osiągająca w zależności od odmiany od 30 do 80 cm wysokości. Liście ciemno zielone, drobne i głęboko powcinane. Kwiaty języczkowate składają się na koszyczki, wybarwienie od jasno żółtego po ciemno purpurowe. Pojawiają się od VII do X. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów znacznie wydłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>lipiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h50	<i>Tagetes tenuifolia</i>	Aksamitka wąskolistna	Jednoroczna roślina o kępiastym pokroju, dorasta do 30 cm wysokości. Liście drobne, wąskie i głęboko powcinane. Kwiaty drobne – koszyczki pojawiają się od VII do X, wybarwienie w zależności od odmiany. Roślina mało wymagająca i łatwa w uprawie. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów znacznie wydłuża kwitnienie	Termin kwitnienia: <b>lipiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	



h51	<i>Ageratum houstonianum</i>	Żeniszek meksykański	Jednoroczna roślina o pokroju wzniesionym i kulistym, dorasta do 30 cm wysokości. Liście drobne, sercowate. Koszyczki kwiatowe wybarwione na fioletowo, bardzo gęste pojawiają się na roślinie od VI do pierwszych przymrozków. Żeniszek preferuje stanowiska nasłonecznione, ciepłe i osłonięte. Gleby żyzne i przepuszczalne.	Termin kwitnienia: <b>od czerwca</b>  kolor kwiatów: <b>fioletowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h52	<i>Begonia semperflorens</i>	Begonia stalekwitnąca	Jednoroczna roślina karłowa o zwartym pokroju, dość łatwo się krzewi. Liście duże i błyszczące, wybarwione na soczyście zielono, brązowo lub bordowo, w zależności od odmiany, kwiaty drobne, równie dekoracyjne pojawiają się od maja i kwitną naprzemiennie do jesieni. Begonia preferuje gleby żyzne o odczynie lekko kwaśnym i wilgotne, dobrze rośnie w pełnym słońcu jak i półcieniu	Termin kwitnienia: <b>od maja</b>  kolor kwiatów: <b>biały</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
	<i>Begonia semperflorens</i>	Begonia stalekwitnąca	Jednoroczna roślina karłowa o zwartym pokroju, dość łatwo się krzewi. Liście duże i błyszczące, wybarwione na soczyście zielono, brązowo lub bordowo, w zależności od odmiany, kwiaty drobne, równie dekoracyjne pojawiają się od maja i kwitną naprzemiennie do jesieni. Begonia preferuje gleby żyzne o odczynie lekko kwaśnym i wilgotne, dobrze rośnie w pełnym słońcu jak i półcieniu	Termin kwitnienia: <b>od maja</b>  kolor kwiatów: <b>różowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	

	<i>Begonia semperflorens</i>	Begonia stalekwitnąca	Jednoroczna roślina karłowa o zwartym pokroju, dość łatwo się krzewi. Liście duże i błyszczące, wybarwione na soczysto zielono, brązowo lub bordowo, w zależności od odmiany, kwiaty drobne, równie dekoracyjne pojawiają się od maja i kwitną naprzemiennie do jesieni. Begonia preferuje gleby żyzne o odczynie lekko kwaśnym i wilgotne, dobrze rośnie w pełnym słońcu jak i półcieniu	Termin kwitnienia: <b>od maja</b>  kolor kwiatów: <b>czerwony</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h53	<i>Calendula officinalis</i>	Nagietek lekarski	Jednoroczna roślina dorastająca do 50 cm wysokości. Kwiaty żółte i pomarańczowe, miododajne, pojawiają się naprzemiennie od VI do IX. Nagietek najobficiej kwitnie na stanowiskach słonecznych i ciepłych, nie ma specjalnych wymagań co do podłoża. Roślina wysiewa się samoistnie	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - wrzesień</b>  kolor kwiatów: <b>pomarańczowy</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
h54	<i>Senesio cineraria</i>	Starzec popielaty	W polskich warunkach klimatycznych roślina traktowana jako jednoroczna (nie zimuje w gruncie), dorasta do 40-80 cm wysokości, ozdobna z pierzastymi liśćmi, głęboko powcinanych, szarzielonych z warstwą kutnerowatych włosków. Kwiaty żółte niezbyt dekoracyjne. Starzec nie ma specjalnych wymagań co do podłoża, najładniej wybarwia się na stanowisku słonecznym	Termin kwitnienia:  kolor liści: <b>srebrny</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>małe</b>	
h55	<i>Zinnia elegans</i>	Cynia wytworna	Jednoroczna roślina o wzniesionych i rozgałęzionych pędach, dorasta do 30 cm wysokości. Liście charakterystycznie szorstkie, jajowato-sercowate. Kwiaty koszyczki - języczkowe sztywne z aksamitnymi włoskami, wybarwione na żółto, rurkowe w środku koszyczka przeważnie również żółte. Kwitnie od VI do X. Cynia wymaga gleb zasobnych w składniki pokarmowe, próchnicznych,	Termin kwitnienia: <b>czerwiec - październik</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	

			dostatecznie wilgotnych oraz stanowisk ciepłych i słonecznych.		
h56	<i>Primula acaulis</i>	Pierwiosnek bezłodygowy	Niska roślina, która nie tworzy rozłogów, zanim zakwitnie liście średniej długości, po kwitnieniu dwa razy dłuższe, ciemnozielone i szorstkie. Bardzo krótki pęd kwiatostanowy lub w ogóle go brak. Kwiaty jasnożółte z ciemniejszym oczkiem do 3 cm średnicy, pojawiają się od kwietnia. Prymula preferuje miejsca półcieniste, na stanowisku słonecznym również sobie radzi - podłoże musi być umiarkowanie stale wilgotne	Termin kwitnienia: <b>kwiecień - lipiec</b>  kolor kwiatów: <b>żółty</b>  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	
Żywopłot istniejący / do wymiany					
	<i>Taxus xmedia 'Hicksii'</i>	Cis pośredni 'Hicksii'	Zimozielony krzew o wzniesionym pokroju, po 10 latach dorasta do ok 3 m wysokości. Pędy wyprostowane, ciemnozielone z błyszczącymi, niekującymi igłami. Klon żeński obficie zawiązuje dekoracyjne, intensywnie czerwone owoce (nasiona w owocach są trujące). Cis jest tolerancyjny w stosunku do podłoża, odporny na mróz oraz zanieczyszczenia środowiska, dobrze rośnie w każdej wystawie słonecznej. Doskonale znosi cięcia.	Termin kwitnienia: -  kolor kwiatów: -  zapotrzebowanie na wodę: <b>średnie</b>	